



Anl. 3.1: Stratigraphische Tabelle der Festgesteinsabfolge im Bereich des Erdwärmesondenfeldes.

Abk.	Formation	Sub-Formation	Bank/Lage
km	Mittelkeuper		
km2	Schilfsandstein-Formation		
DM		Dunkle Mergel	
km2s		Schilfsandstein	
km1	Gipskeuper-Formation		
OBE		Obere Bunte Estherien-Schichten	
GES		Graue Estherien-Schichten	
UBE		Untere Bunte Estherien-Schichten	
MGH		Mittlerer Gipshorizont	
WEH		Weinsberg-Horizont	
DRM		Dunkelrote Mergel	
			Entringen-Sulfat
BH		Bochingen-Horizont	
GI		Grundgipsschichten	
ku	Unterkeuper*		
GRE	Grenzschichten		
Gd		Grenzdolomit	
GRM	Grüne Mergel		
LI	Lingulaschichten		
LD		Lingula-Dolomit	
BGi		Böhringen-Gipshorizont	
AP	Anoplophoraschichten		
OGM		Obere Graue Mergel	
Ad		Anoplophoradolomit	
LGT		Liegendton	
ABS	ALBERTI-Schichten		
SPS		Sandige Pflanzenschiefer	
Ab		ALBERTI-Bank	
HSS	Hauptsandsteinschichten (nicht nachgewiesen)		
ES	Estherienton		
B	Basisschichten		
UDO		Untere Dolomite	
Bk		Blaubank	
VS		Vitriolschiefer	
mo	Oberer Muschelkalk		
moR	Rottweil-Formation (früher: Obere Hauptmuschelkalk- Formation)		
mo2D		Trigonodus-Dolomit	
HAD			Hangenddolomit

* Der Unterkeuper wurde nicht in vollständiger Abfolge angetroffen.